

# वाङ्मपणा : कारणे व उपाय

## डॉ. चैतन्य पावशे

पशुजनन, मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग  
स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.

गायी व्याल्यानंतर नियमितपणे माजावर येवून गाभण राहिल्यास व्यवसायाकरीता फायदेशीर ठरतात. साधारणपणे गाईपासुन वर्षाला एक वेत मिळणे दुग्धव्यवसाय किफायतशीर होण्यासाठी अत्यंत गरजेचे असते. परंतु काही गायी व्याल्यानंतर योग्य वेळेत माजावर येत नाहीत याला वाङ्मपणा असे म्हणतात.

वाङ्मपणा हा दोन प्रकारचा असतो.

### १. कायमस्वरुपी वाङ्मपणा

वाङ्मपणाच्या ह्या प्रकारात गाईची प्रजनन क्षमता काही विशिष्ट कारणांमुळे नष्ट झालेली असते. अशा वाङ्मपणासाठी काही उपचार नसतो. उदा. स्त्रीबीजांडाची वाढ न होणे, गर्भशियाची अपुरी वाढ, इ.

### २. तात्पुरता वाङ्मपणा

तात्पुरता वाङ्मपणा यामध्ये प्रजननक्षमता काही अवधी/ काळासाठी काही विशिष्ट घटकामुळे नष्ट/कमी झालेली असते. तात्पुरता वाङ्मपणा हा योग्य औषधीपचार करून बरा होऊ शकतो. उदा. आहारातील दोष, प्रजननसंस्थेचे आजार, इ. तात्पुरत्या वाङ्मपणाची काही महत्वाची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.

#### १. प्रजनन संस्थेचे आजार

गाईला होणाऱ्या प्रजनन संस्थेच्या आजारांमुळे प्रजननक्षमता काही कालावधीकरिता खंडीत होते. उदा. ब्रुसेलासीस, इ.

#### २. आहारातील दोष किंवा अयोग्य आहार

गाईमधील योग्य प्रजननकरिता उर्जा, प्रथिने स्निग्धपदार्थ, खनिजे व जीवनसत्वे यांचा आहारामध्ये समावेश असणे गरजेचे असते. असंतुलीत आहार किंवा आहारामधील एखाद्या किंवा अनेक घटकांच्या कमतरतेमुळे गाईमध्ये वंधत्व येते.

#### ३. विविध रोगांचा ताण

गाईमधील विविध जीवाणुजन्य तसेच विषाणुजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव होत असतो. रोगामुळे शरीरामध्ये ताण निर्माण होतो व शरीरातील संप्रेरके यांचे संतुलन बिघडते. यामुळे तात्पुरता वाङ्मपणा तयार होतो.

#### ४. व्याल्यानंतर अयोग्य देखभाल

व्याल्यानंतर गाईची देखभाल (बसण्याची जागा, पाणी, खाद्य, व्यायाम) संतुलीत करणे गरजेचे असते परंतु अस्वच्छ गोठा व बसण्याची जागा, कमी प्रतीचा आहार यामुळे गाईमध्ये ताण निर्माण होतो. काही गाईमध्ये गर्भशियाचा जंतुसंसर्ग होतो व गर्भशियाचे विकार जडतात. यामुळे तात्पुरता वाङ्मपणा निर्माण होतो.

वाङ्मपणा कमी करण्याकरिता पशुपालकांनी घ्यावयाची काळजी

१. गाई योग्य वयात (देशी गाई जन्मानंतर अडीच ते तीन वर्षे व संकरीत गाई दीड वर्षांनी) माजावर न आल्यास पशुवैद्यकाकडून तपासणी व योग्य मार्गदर्शन घ्यावे.
२. गाय व्याल्यानंतर ६० दिवसांनी माजावर न आल्यास पशुवैद्यकाकडून गाईची लैंगिक तपासणी करून घ्यावी.
३. गाईला संतुलित आहार हा त्याच्या वजनाच्या व दुग्ध उत्पादनाच्या प्रमाणात द्यावा.
४. गाईना दर तीन महिन्यांनी जंत निर्मुलनाचे औषध पशुवैद्यकाच्या सल्यानुसार द्यावे.
५. गाईना दररोज खनीजमिश्रण व जीवनसत्वे यांची पावडर (५० ते १०० ग्रॅम) आंबोणामधून द्यावी.
६. गाईची चांगली देखभाल व व्यवस्थापन करावे.